

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

(R)

Direction Régionale de l'Agriculture  
 SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
 Ancienne Conserverie de CASAMOZZA  
 LUCCIANA - 20290 BORGIO -

☎ (95) 36.05.70



## Edition Corse

Bulletin Technique n° 76  
 du 18 Avril 1986

:  
 : En cas de grêle, intervenir dans les 24 :  
 : heures avec une spécialité à base de :  
 : folpel ou de captane. :  
 :

### VIGNE

Si les pousses de Niellucciu et de Muscat atteignent 10 à 15 cm, certains cépages sont encore au stade D.E. comme Ugni Blanc, Merlot, Sciaccarellu.

#### \*\*\* Oïdium

Un premier traitement précoce au stade 3 à 5 feuilles doit-être impérativement réalisé sur toutes les parcelles atteintes en 1985. Il sera à renouveler sur les cépages sensibles = Carignan et Cinsault - 14 jours après.  
 Vous pouvez utiliser :

--> les soufres en poudre à la dose de 20 à 30 kg /ha

--> les soufres mouillables à la dose de 12,5 kg/ha

--> des produits organiques de synthèse : ce sont des produits pénétrants qui s'utilisent à la cadence de 12 à 14 jours. N'ont pas besoin d'être renouvelés après la pluie :

VIGIL, RUBIGAN 4, RUBIFLO, TRIMIDAL, OLYMPE, TOPAZE, BAYLETON 5, BAYTAN, SAPROL, DENARIN -

( Le Vigil ne doit pas être utilisé sur Cabernet et Cabernet -Sauvignon)

#### \*\*\* Mildiou

Ne pas adjoindre un anti-mildiou - les risques sont nuls.  
 Inutile d'utiliser une spécialité mixte mildiou - oïdium

## CULTURES LEGUMIERES SOUS SERRE

\*\*\* Attention à la **pourriture grise**. Dès l'apparition d'un temps pluvio-orageux, intervenir dès les premières taches avec :

dichlofuanide	EUPARENE
iprodione	ROVRAL
vinchlozoline	RONILAN
procymidone	SUMISCLEX

Alterner les traitements, suivant les recommandations d'utilisation du fabricant.

\*\*\* Surveillez les infestations de **pucerons** intervenir de préférence avec :

pirimicarbe	PIRIMOR
heptenophos	HOSTAQUICK

\*\*\* Surveillez l'évolution des **aleurodes**. Traitez les zones infestées. Préférez la Bioresmethrine (ISATHRINE, RESBUTHRIN). Se reporter au bulletin n° 73 pour d'autres produits.

### \*\*\* Mildiou de la pomme de terre

Ce temps pluvieux peut localement être favorable à l'apparition du **mildiou**. Il est recommandé d'assurer :

+++ Une protection préventive avec :

chlorothalonil	DACONIL ET FONGIL
Cuivre	Nombreuses Spécialités
Folpel	" "
Manébe	" "
Zinébe	" "
Mancozébe	" "

et associations

Métirame de zinc	POLYRAM
Fentime Acetate + Manébe	BRESTAN
Manébe + Zinébe + Ferbame	TRICARBAMIX ET TRIMANZONE

+++ une prévention curative avec :

Captafol	Nombreuses Spécialités
Cymoxanil	FULVAX, REMILTINE, AVISO, DIAMETAN
Oxadixyl	PULSAN
Métalaxyl + Manébe	ACYLON

.../...



### \*\*\* Oidium des cucurbitacées

Ce champignon peut se développer actuellement en serre. Soyez vigilants. Dès les premiers symptômes, il est possible de stopper son évolution avec :

Chinométhionate	MORESTAN (action sur acariens)
Dinocap	KARATHANE
Fenarimol	RUBIGAN, RUBIFLO
Imazalil	FUNGAFLOR
Pyrazophos	AFUGAN
Soufre	Nombreuses Spécialités (action sur acariens)
Triforine	SAPROL DENARIN FUNGINEX
Thiophanate -Méthyl	PELT- PELTIS
Bupirimate	NIMROD FISIONS
Triadimefon	BAYLETON

ne s'emploient qu'en plein champ.

### ARBRES FRUITIERS

#### \*\*\* Acariens sur pêchers

Observez à la loupe la présence de larves. N'intervenir que si 60 % du feuillage est occupé par un acarien ou plus. Réalisez un sondage sur des rameaux, puis au hasard dans tout le verger, avec :

APOLLO	Clofentézine - action ovicide
CROPOTEX	flu <del>benz</del> imimine -action sur les larves. A utiliser en cours d'éclosion
CESAR	hexy <del>thi</del> arox = action sur les oeufs et contre les larves. A utiliser en fin d'éclosion.

Alternez les Matières Actives, pour éviter les problèmes d'accoutumance.

#### \*\*\* pucerons

Toujours à surveiller.

Ajoutez à la liste du bulletin n° 74 le KLARTAN

#### \*\*\* cochenilles

Dans la plupart des vergers Corses, on observe des

... cochenilles à carapaces dites lécanines

... cochenilles à bouclier dites diaspinées

Les cochenilles sont ainsi protégées naturellement contre les insecticides de contact. Il faut donc plutôt atteindre les larves (jeunes cochenilles) lorsqu'elles quittent le bouclier de la mère et se déplacent sur les végétaux avant de s'y fixer définitivement.

<u>Produits conseillés</u> :	malathion
	methidathion
	omethoate
	parathion

.../...

Cependant, il convient de bien observer les colonies avant de déclencher le traitement, car de nombreuses **cochenilles mères**, présentent un petit trou indiquant qu'elles ont été parasitées par de minuscules guêpes. Il faut éviter de les tuer, car elles peuvent rétablir une situation de pullulation.

#### MALADIES DU PRUNIER

Dès la chute des pétales, renouvelez le traitement

\*\*\* contre le **monilia** des fruits avec T.M. T.D  
Triforine

\*\*\* contre la **rouille**  
Mancozébe  
Zinébe  
Chlorotalonil

Veillez à la présence de **pucerons** qui peuvent pulluler très rapidement lorsque la température s'élève, utilisez alors du phosalone ou azinphos. Ces traitements toucheront également les **carpocapses**.

#### COLZA

Les stades F.F 2 " Floraison" sont atteints.

Les attaques de meligêthes et de charançons des tiges ne sont plus à craindre par contre, il convient de surveiller la présence des **pucerons cendrés**, qui provoquent des avortements de fleurs et de l'échaudage.

Traitez à partir de deux colonies visibles par mètre carré en bordure. Le traitement en bordure en début d'infestation est généralement suffisant.

#### Produits

SOVINEXION	bromophos méthyl
ZOLONE AZOPHENE	phosalone
PIRIMOR	pirimicarbe
SERK	endosulfan + thiometan

#### AGRUMES

Présence de forme d'acariens dans presque tous les vergers.

Utilisez un acaricide spécifique.

O-O-O-O-O-O-O-O-O-